

Wecan®

Insectenbestrijdingsmiddel

Toelatingsnummer: I6267 N

Aard van het preparaat:
emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof(fen) en gehalte(n):
azadirachtine (26 g/l)

De identiteit van alle stoffen in het
mengsel die bijdragen tot de indeling
van het mengsel: azadirachtine

Verdeeld door:

SIPCAM Benelux BVBA

Th. Decuypersstraat 100 B-1200 Brussel
Tel. +32 2 770 00 37

Toelatingshouder:

SIPCAM OXON S.p.A.

Via Sempione 195 20016

Pero (Milano, IT) - T. +39 02 35378 400

STORL VERPAKKING Bedrijfsafval	Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven
---	---

Chargenummer:

Zie elders op de verpakking



5L e

Dit middel is uitsluitend
bestemd voor
professioneel gebruik

® Geregistreerd
handelsmerk van
SIPCAM OXON S.p.A.

UFI: UYMU-QWRC-N60G-XXRT

WAARSCHUWING



Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P280C Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een
arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar
verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk
afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren
conform STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

UN 3082



Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het SIP-CAM BENELUX-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen. Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen. Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Medische bewaking gedurende tenminste 24-48 uur.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassings - gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbei (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Trips, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	4	7	7
Sla (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Sla (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7
Spinazie (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Spinazie (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7

Toepassings - gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Aardbei (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Trips, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	4	7	7
Sla (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Sla (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7
Spinazie (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Spinazie (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7
Courgette (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Komkommer (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Pompoen (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Meloen (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Watermeloen (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Aubergine (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, To-maatmineermot*1, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3

Toepassings - gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Tomaat (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot*1, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	3
Paprika (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Trips, Tomaatmineermot*1, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	5	7	7
Basilicum (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Basilicum (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7
Peterselie (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	7
Peterselie (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	3	10	7
Potplanten (bedekte, niet- grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1 - 0,12% (0,1 - 0,12 l middel per 100 liter water)	1,2 l/ha	5	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,9 l/ha	5	7	-
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen, Trips	0,1% (0,1 l middel per 100 liter water)	0,8 l/ha	5 per teeltcyclus, 35 per 12 maanden	10	-

Toepassings- gebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Boomkwekerij-gewassen (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen*2, Trips	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	
Veredelingsteelt en basiszaad- productie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteelt-g ⁹ W6SS9n, (bedekte, grondgebonden teelt)	Bladluizen, Wittevlieg, Dwergcicaden, Mineervlieg, Rupsen*2	0,1 - 0,15% (0,1 - 0,15 l middel per 100 liter water)	1,5 l/ha	3	7	

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*1 Tomaatmineermot (*Tuta absoluta*)

*2 Uilenmot (*Noctuidae*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla en spinazie, peterselie en basilicum, het middel toepassen in 800 liter water per ha.

In de niet grond gebonden teelt van sierteelt gewassen, het middel toepassen in 900 liter water per ha.

In de grond gebonden teelt van sierteelt gewassen, het middel toepassen in 800 liter water per ha.

In alle andere teelten het middel toepassen in 1000 liter water per ha.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van dit middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten niet onderbouwd.

Voer een proefbespuiting uit voordat dit middel op grote schaal toegepast wordt.

AANBEVELINGEN

Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Klaarmaken spuitvloeistof

Voor een optimaal resultaat dient de pH van de te bereiden spuitoplossing tussen de 5.0 en 6.0 te liggen.

Gewasveiligheid algemeen

Gezien de diversiteit aan sier- en groentegewassen in de bedekte teelt is het onmogelijk de gewasverdraagzaamheid voor alle cultivars te onderzoeken.

Het wordt aanbevolen om in gewassen of cultivars waar nog geen ervaring is opgedaan met Wecan, door middel van een proefbespuiting op kleine schaal vast te stellen of het betreffende gewas of cultivar het middel verdraagt.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

Wecan®

Insectenbestrijdingsmiddel

Toelatingsnummer: I6267 N

Aard van het preparaat:
emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof(fen) en gehalte(n):
azadirachtine (26 g/l)

De identiteit van alle stoffen in het
mengsel die bijdragen tot de indeling
van het mengsel: azadirachtine

Verdeeld door:

SIPCAM Benelux BVBA

Th. Decuypersstraat 100 B-1200 Brussel
Tel. +32 2 770 00 37

Toelatingshouder:

SIPCAM OXON S.p.A.

Via Sempione 195 20016

Pero (Milano, IT) - T. +39 02 35378 400

STORL VERPAKKING Bedrijfsafval	Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven
---	---

Chargenummer:

Zie elders op de verpakking



5Le

Dit middel is uitsluitend
bestemd voor
professioneel gebruik

® Geregistreerd
handelsmerk van
SIPCAM OXON S.p.A.

UFI: UYMU-QWRC-N60G-XXRT

WAARSCHUWING



Gevarenaanduidingen:

H317 Kan een allergische huidreactie
veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P280C Beschermende handschoenen en
beschermende kleding dragen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een
arts raadplegen.

P363 Verontreinigde kleding wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar
verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk
afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren
conform STORL.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of
zijn verpakking geen water verontreinigt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

UN 3082