

Zetanil solo WG

Fungicide ter bestrijding van de
aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)
in aardappelen

Water disperseerbaar
granulaat (WG) op basis van 50% cymoxanil

Toelatingsnummer: 12920 N (W.2.)

Dit middel is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

Chargennummer/Formuleringsdatum:
zie verpakking

Inhoud: 1 Kg^e

Toelatingshouder:



SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione 195 - 20016 Pero
(MI) Italy - T. +39 02 35378 400 | F. +39 02 3390275

Gedistribueerd door:

SIPCAM Benelux SPRL | Rue Théodore De Cuyper, 100
1200 Brussel - T. + 32 (0)2 770 00 37

FUNGICIDE

1Kg^e

Zetanil solo™ WG**Toelatingsnummer:** 12920 N (W2)**Werkzame stof:** cymoxanil Gehalte: 50%**Formulering:** Water dispergeerbaar granulaat (WG)**Gevarenaanduidingen**

H302 Schadelijk bij inslikken. H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373 Kan schade aan bloed en thymus veroorzaken bij langdurige/lang-durige of herhaalde blootstelling. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208 Bevat cymoxanil. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

P264 Na het werken met dit product grondig wassen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. SPo2 Was alle beschermendekleding na gebruik.

WAARSCHUWING**A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen met dien verstande dat het middel maximaal vier maal per groeiseizoen mag worden toegepast.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 7 dagen voor consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen en pootaardappelen.

B. GEBRUIKSAANWIJZING**Toepassingen**

Consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*). Indien nodig vanaf de opkomst van het gewas regelmatig toepassen om de 7-14 dagen, afhankelijk van ras, gewasontwikkeling, weersomstandigheden en ziektedruk. Niet vaker dan vier maal per groeiseizoen toepassen. Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product alleen toepassen in combinatie met een middel met een preventieve werking.

Dosering: 0,24 kg middel per ha

Voor de dosering van het daartoe toegelaten, preventieve middel in de tankmenging wordt verwezen naar het etiket van dit middel. Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan.

STORL
VERPAKKING
Bedrijfsafval

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeldzoals
wettelijk is voorgeschreven.

UN 3077