WINTERGERST EN ZOMERGERST (open lucht)
Spectrum; tegen het geheel van de bladziektes: netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*), dwergroest (*Puccinia hordei*), echte meeldauw (*Erysiphe graminis*). Toepassingstijdstip; een behandeling uitvoeren in het stadium "eerste knoop of laatste bladband" (BBCH 31 of 45). Opmerking; maximum 1 behandeling per teelt. Dosis; 1-1,5 l/ha (de hoogste dosis enkel toepassen in geval van zware aantasting). Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
• WINTERTARWE, ZOMERTARWE EN TRITICALE (open lucht)
Spectrum; tegen echte meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), kafjesbruin (*Septoria nodorum*) en bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*). Toepassingstijdstip; een behandeling uitvoeren in het stadium"eerste knoop aarvorming (BBCH 31-59) Opmerking; maximum 1 behandeling per seizoen. Dosis; 1 l/ha. Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
• KOOLZAAD (open lucht)
Spectrum; ter voorkoming van het legeren door reductie van stengelgroei. Toepassingstijdstip; Bloemknoppen van de hoofdbloemtros individueel zichtbaar, gesloten - bloemknoppen van de secundaire bloemtrossen individueel zichtbaar, gesloten (BBCH 55-57) Opmerking; maximum 1 behandeling / teelt. Dosis; 0,5 l/ha in menging met 144 g ethefon/ha.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
• GRASZAADTEELT (open lucht)
Spectrum; kafjesbruin (*Septoria nodorum*), bladvlekkenziekte/septoriose (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*), bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), netvlekkenziekte/strepenziekte (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*) en echte meeldauw (*Erysiphe graminis*). Toepassingstijdstip; stadium tweede knoop tot midden aarvorming (BBCH 32-55).
Opmerking; maximum 1 behandeling per teelt. Dosis; 1 l/ha.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
• PREI (open lucht)
Spectrum; voor de bestrijding van roest op prei (*Puccinia porri*). Toepassingstijdstip; toepassen vanaf het verschijnen van de eerste symptomen. Opmerking; maximaal 3 behandelingen per teelt, met een interval van 2 weken. Dosis; 1 l/ha. Wachttijd; 2 weken. Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
• SLUITKOOL (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht), BLOEMKOOL (witte en groene, open lucht), SPRUITKOOL (open lucht)
Spectrum; ter bestrijding van de zwartevlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*), spikkelziekte, alternaria (*A. brassicae, Alternaria brassicicola*) en echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*). Toepassingstijdstip; vanaf het verschijnen van de eerste symptomen. Dosis; 3 toepassingen van 0,5 l/ha met een interval van 3 weken ofwel 1 l/ha gevolgd door 0,5 l/ha, 21 dagen.
Wachttijd; 3 weken. Opmerking; Maximum 1,5 l/ha/seizoen.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
• WORTELEN EN PASTINAAK (open lucht)
Spectrum; tegen echte meeldauw (*Erysiphe heracle*) en alternaria (*Alternaria Dauci*). Toepassingstijdstip; toepassen vanaf eind juli bij het verschijnen van de eerste symptomen. Opmerking; maximaal 3 behandelingen per 12 maanden, met een interval van 2 à 3 weken. Dosis; 1 l/ha. Wachttijd; 3 weken.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
• KERSEN- EN KRIEKENBOMEN (open lucht)
Spectrum; ter bestrijding van vruchtrot (*Monilia fructigena*) en tak-en bloesemsterfte (*Monilia laxa*). Maximum 2 behandelingen met een interval van 7-10 dagen, te behandelen in het stadium "witte knop - volle bloei" (BBCH 57-65). Dosis; 0,5 l/ha vruchtboomhaag (laagstam) of 50 ml/100 l water
(hoogstam). Wachttijd; 1 week. Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 3 m met klassieke technieke.
• SIERBOMEN en -HEESTERS (niet bestemd voor consumptie) en BOOMKWEKERIJ
Spectrum; ter bestrijding van roest (*Puccinia, Uromyces, Phragmidium*). Opmerking; maximum 1 behandeling per 12 maanden. Dosis; 80 ml/100 l water.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 3 m met klassieke technieke.
• LOOFBOMEN EN-HEESTERS (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie)
Spectrum; ter bestrijding van tak- en bloesemsterfte (*Monilia laxa*). Opmerking; maximum 1 behandeling per 12 maanden. Dosis; 0,05 l/100 l water.
Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 3 m met klassieke technieke.
• BOSBOUW
Spectrum; ter bestrijding van populierenroest (*Melampsora spp.*) Toepassingstijdstip; toepassen bij het verschijnen van de eerste symptomen. Opmerking; maximum 1 behandeling. Alleen de gevoelige populierenrassen Beaupré, Boelare, Hoogvorst en Hazendans mogen worden behandeld. De behandeling dient te gebeuren met een tractor voorzien van een gesloten cabine. Dosis; 0,08 l/100 l. Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 3 m met klassieke technieke.
• RAAP (stoppelraap, meiraap) (open lucht)
Spectrum; ter bestrijding van de zwartevlekkenziekte (*Mycosphaerella brassicicola*), spikkelziekte, alternaria (*Alternaria brassicae*), en echte meeldauw (*Erysiphe cruciferarum*). Toepassingstijdstip; vanaf het verschijnen van de eerste symptomen. Dosis; 3 toepassingen van 0,5 l/ha met een interval van 3 weken ofwel 1 l/ha gevolgd door 0,5 l/ha, 21 dagen later. Wachttijd; 3 weken. Opmerking; maximum 1,5 l/ha/seizoen. Risicobeperkende maatregelen; bufferzone van 1 m met klassieke technieke.
OPMERKINGEN
- De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

ANDERE VERMELDINGEN:
SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik.
SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. Omwille van wisselende teeltvoorwaarden bij vele verschillende soorten en variëteiten van sierplanten, kunnen wij geen algemeen bindende uitspraak doen over de selectiviteit van het product. Wij raden daarom aan om op enkele planten een tolerantietest uit te voeren in elk gewasstadium en bij diverse teeltvoorwaarden; indien het resultaat voldoet, dan pas kan de hele teelt behandeld worden. Het toepassingsrisico ligt bij de gebruiker, aansprakelijkheid van de erkenningshouder is uitgesloten.

EERSTE HULP MAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangeraste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het **Antigifcentrum 070/245.245**
ADVIES VOOR DE GENEESHEER
Symptomatisch behandelen. Product bevat propyl(2S)-2-hydroxypropanoaat, CAS No 5365 1-69-7.
LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN + GARANTIE
De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt (zie www.agrirecover.eu). Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelden oppervlakte en van het debiet per hectare. Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Daar zijn doeltreffendheid kan afhangen van de interactie van diverse factoren (grond, weer, varieteit, enz...) waarvan het effect onvoorzienbaar is, wijzen wij van te voren alle verantwoordelijkheid af voor een minder goede werking of schade.

ORGE DE PRINTEMPS ET D'HIVER (plein air)
Spectre; contre l'ensemble des maladies du feuillage: Helminthosporiose (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*), rhynchosporiose (*Rhynchosporium secalis*), rouille naine (*Puccinia hordei*) et oïdium (*Erysiphe graminis*). Stade d'application; traiter au stade "1er noeud ou gaine éclatée" (BBCH 31 ou 45).
Condition particulière; maximum 1 traitement par culture.
Dose; 1-1,5 l/ha (la dose la plus haute ne sera appliquée qu'en cas de forte infestation).
Mesures de reduction du risque; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• FROMENT DE PRINTEMPS, D'HIVER ET TRITICALE (plein air)
Spectre; Oïdium (*Erysiphe graminis*), rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*), septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*) et septoriose des feuilles (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*). Stade d'application; traiter au stade "1er noeud - épiaison" (BBCH 31-59). Condition particulière; maximum 1 traitement par culture. Dose; 1 l/ha.
Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• COLZA (plein air)
Spectre; contre la verse par réduction de la croissance des tiges.
Stade d'application; Les boutons floraux de l'inflorescence principale sont individuellement visibles mais fermés-les boutons floraux des inflorescences secondaires sont individuellement visibles mais toujours fermés (BBCH 55-57). Condition particulière; maximum 1 traitement. Dose; 0,5 l/ha en mélange avec 144 g d'éthefon/ha.
Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• GRAMINÉES (PRODUCTION DE SEMENCES) (plein air)
Spectre; septoriose de l'épi (*Septoria nodorum*), septoriose des feuilles (*Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum*), rouille brune (*Puccinia recondita*), rouille jaune (*Puccinia striiformis*), helminthosporiose (*Pyrenophora, Helminthosporium, Drechslera*) et oïdium (*Erysiphe graminis*). Stade d'application; 2e noeud miépiaison. Condition particulière; maximum 1 application par culture. Dose; 1 l/ha. Mesures de reduction du risque; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• POIREAU (plein air)
Spectre; pour la lutte contre la rouille du poireau (*Puccinia porri*).
Stade d'application; appliquer dès l'apparition des premiers symptômes.
Condition particulière; maximum 3 traitements avec un intervalle de 2 semaines.
Dose; 1 l/ha. Délai avant récolte; 2 semaines. Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• CHOUX POMMES (chou cabus, blanc, rouge et chou de savoie)(plein air), CHOU-FLEUR (blanc et vert)(plein air), CHOU DE BRUXELLES (plein air)
Maximum 1,5 l/ha/saison. Spectre; pour lutter contre la maladie des taches noires (*Mycosphaerella brassicola*), l'alternariose (*Alternaria brassicae et brassicicola*) et l'oïdium des crucifères (*Erysiphe cruciferarum*). Stade d'application; appliquer le produit dès l'apparition des premiers symptômes. Dose; 0,5 l/ha, 3 applications avec un intervalle de 3 semaines ou 1 l/ha suivi de 0,5l/ha, 21 jours plus tard. Délai avant récolte; 3 semaines. Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• CAROTTES ET PANAIS (plein air)
Spectre; pour lutter contre l'oïdium (*Erysiphe heraclie*) et l'alternariose (*Alternaria dauci*). Stade d'application; traiter dès l'apparition des premiers symptômes (dès la fin juillet). Remarque; maximum 3 traitements par 12 mois en fonction de l'infection avec un intervalle de 2 à 3 semaines. Dose; 1 l/ha.
Délai avant récolte; 3 semaines. Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
• CERISIERS ET GRIOTTIERS (plein air)
Spectre; pour lutter contre la moniliose (*Monilia fructigena*) et la moniliose des fleurs et des branches (*Monilia laxa*). Dose; 0,5 l/ha de haie fruitière (arbres à basses tiges) ou 50 ml/100 l d'eau (arbres à hautes tiges), deux traitements au maximum avec un intervalle de 7-10 jours, dans le stade « bouton blanc - pleine floraison » (BBCH 57-65). Délai avant récolte; 1 semaine.
Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 3 m avec technique classique.
• ARBRES ET ARBUSTES ORNEMENTAUX, PÉPINIÈRES D'ARBRES ET D'ARBUSTES (non destinés à la consommation)
Spectre; pour lutter contre la moniliose des fleurs et des branches (*Monilia laxa*). Condition particulière; maximum 1 traitement par 12 mois.
Dose ; 0,05 l/100 l d'eau. Mesures de reduction du risque; Zone tampon de 3 m avec technique classique.
• PEUPLEMENT FORESTIER
Spectre; pour lutter contre la rouille du peuplier (*Melampsora spp.*)
Stade d'application; traiter dès l'apparition des premiers symptômes.
Remarque ; maximum 1 traitement. Le traitement doit être limité aux variétés de peupliers sensibles: Beaupré, Boelare, Hoogvorst et Hazendans. Le traitement doit être réalisé avec un tracteur possédant une cabine fermée.
Dose; 0,08l/100 l. Mesures de reduction du risqué; Zone tampon de 3 m avec technique classique.
• NAVET (plein air)
Maximum 1,5 l/ha/saison. Spectre; Pour lutter contre la maladie des taches noires (*Mycosphaerella brassicicola*), l'alternariose (*Alternaria brassicae*) et l'oïdium des crucifères (*Erysiphe cruciferarum*). Stade d'application; appliquer le produit dès l'apparition des premiers symptômes. Dose; 0,5 l/ha, 1-3 applications avec un intervalle de 3 semaines ou 1 l/ha suivi 0,5 l/ha, 21 jours plus tard. Délai avant récolte; 3 semaines. Mesures de réduction du risque; Zone tampon de 1 m avec technique classique.
REMARQUES
- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

AUTRES MENTIONS
SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPo: Ne pas pénétrer dans les cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complétement sec.
SPo2: Laver tous les équipements de protection après utilisation.
SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de reduction du risqué).
Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agréation. Du fait des conditions variables de culture pour de nombreuses sortes et variétés différentes de plantes ornementales, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon générale et contractuelle au sujet de la sélectivité du produit. Nous conseillons d'effectuer pour cette raison un test de tolérance sur quelques plantes dans chaque étape de croissance et sous diverses conditions de culture; si le résultat est satisfaisant, alors seulement la culture entière pourra être traitée. L'application se fait au risque de l'utilisateur, toute responsabilité du détenteur d'homologation est exclue.
CONSEILS DE PREMIERS SECOURS
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.
Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245**
INDICATION POUR LE MEDECIN
Traiter de façon symptomatique.
Produit contient du propyle(2S)-2-hydroxypropanoate, No CAS 5365 1-69-7.
Téléphone en cas d'urgence: 070/245 245 (Centre Antipoisons)
EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT + GARANTIE
L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet (voir www.agrirecover.eu). Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, etre réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on sèfforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare. Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Comme son efficacité peut dépendre de l'interaction de facteurs dont les effets ne sont pas toujours prévisibles (sol, météorologie, variété etc…) nous déclinons d'avance toute responsabilité pour une efficacité moindre ou pour des dégâts.

GEVAAR/DANGER



UN 3082

Gevarenaanduidingen: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen: P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BU CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308+P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte / gemorste stof opruimen. P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie: EUH208 Bevat 2-ethylhexyl(2S)-2-hydroxypropanoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Antigifcentrum / Centre Antipoisons: +32 (0) 70 245 245

Mentions d'avertissement: H318 Provoque des lésions oculaires graves. H361d Susceptible de nuire au foetus. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P263 Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse / pendant l'allaitement. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspecté: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations additionnelles: EUH208 Contient du 2-ethylhexyle(2S)-2-hydroxypropanoate. Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Tebusip®

Fungicide in de teelt van o.a. granen, graszaadteelt, prei, kolen, wortel- en knolgroenten, kersen en krieken, sierbomen en heesters en boomkwekerij.
Groeiregulator voor koolzaad.

Fongicide en culture de e.a. céréales, graminées (production de semences), poireau, choux, carottes, légumes-racines et légumes-tuberculescerisiers et griottiers, arbres et arbustes ornementaux et pépinières. Régulateur de croissance en culture de colza.

EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC)
op basis van 250 g/l (25,00% w/w) tebuconazool.
CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (EC)
contenant 250 g/l (25,00% w/w) de tébuconazole.

Erkenningnummer / Numéro d'agréation: 9766P/B
Aandachtig het etiket lezen alvorens te gebruiken.
Lire attentivement l'étiquette avant l'emploi.
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking
Numéro de lot et date de production: voir emballage

Erkenningshouder/Détenteur de l'agréation :
OXON Italia S.p.A. Via Sempione 195
20016 Pero (MI) Italy - T. +39 02 35378 238
Verdeeld door/Distribué par :
SIPCAM Benelux BVBA/SPRL
Rue Théodore De Cuyper 100 B-1200
Brussel/Bruxelles - T. (0)2 770 00 37
www.sipcambnl.com

1 Le

Product bestemd voor beroepsgebruik
Produit destiné à un usage professionnel

® Gedeponeerd handelsmerk van / Marque déposée par OXON Italia S.p.A.

SIPCAM BENELUX

AgriRecover
www.agrirecover.eu